

3236 MIRRA EVA

biokomplex pro ženy
biologicky aktivní doplněk stravy

Období „kolem čtyřicítky“ bývá časem, kdy se začíná zřetelně projevovat změna hormonální hladiny - snižuje se činnost pohlavních žláz a postupně ustává menstruační cyklus. Ženy často v tomto věku zažívají pocity neklidu, bolesti i „točení“ hlavy, návaly, bušení srdce, noční pocení, bolesti v oblasti srdce. A hlavně - dostavuje se emocionální labilita, podráždění, deprese.

Příčinou výše uvedených obtíží se jeví nedostatek pohlavních hormonů a zároveň deficit mnohých životně důležitých látek - vitaminů, mikroelementů, a také předchůdců pohlavních hormonů. Tyto látky rostlinného původu (fytoestrogeny) napomáhají organismu obnovit hormonální hladinu.

MIRRA EVA se doporučuje užívat během jídla, dle doporučené kúry jak samostatně, tak i společně s dalšími biologicky aktivními doplňky stravy MIRRA. Níže uvádíme program profylaxe a prevence potíží spojených s obdobím klimakteria, které přímo souvisí s nedostatkem estrogenů a dalších důležitých látek v organismu.

Profylaxe v období klimakteria:

biologicky aktivní doplněk stravy MIRRA	počet tobolek na 1 dávku	kolikrát denně	délka kúry (počet dnů)
MIRRA EVA	1	2	25
přestávka 3 dny			
MIRRA EVA	1	2	25

Na 1 kúru je třeba: 2 balení MIRRA EVA

MIRRA EVA se osvědčila ve všech případech komplexního profylaktického působení na obnovu funkcí mnohých orgánů a systémů v organismu. V období klimakteria dochází k rozvoji a/nebo ke zostření mnohých onemocnění. Počínající příznaky, které na první pohled spolu navzájem nesouvisí, ovšem ve skutečnosti mají společný základ – nedostatek životně důležitých látek. Jedná se o bioflavonoidy, vitaminy, mikroelementy, některé aminokyseliny, polynenasycené mastné kyseliny a další. To jsou důvody pro užívání speciálních biologicky aktivních doplňků stravy, které napomáhají doplnit deficit a následně ozdravit organismus.

Níže uvádíme několik doporučených kombinací při užívání MIRRA EVA a dalších BADS MIRRA, kdy byl zaznamenán profylaktický a ozdravný účinek.

V počátečním stadiu klimakteria a při předčasném stárnutí.

MIRRA EVA (1-2 tob. 2x denně) + MIRRASELEN (1 tob. 2x denně) + MIRRASET (1 tob. 2x denně).
Délka kúry: 25 dnů. Kúru je doporučeno po 5denní přestávce opakovat.

Při emocionální labilitě, podráždění a poruchách spánku.

MIRRA EVA (1-2 tob. 2x denně) + MEDELLA 2 (1 tob. 2x denně) + MIRRASIL 3 (2 tob. 2x denně).
Délka kúry: 25 dnů.

Při dispozici k nedostatku a při nedostatku vápníku v organismu s následujícími příznaky: řídnutí kostní tkáně (osteoporóza), poruchy srdečního rytmu, poruchy krvácivosti.

MIRRA EVA (1 tob. 2x denně) + MIRRAKALCIUM (4 tab. 2x denně).

Délka kúry: 25 dnů. Kúru je doporučeno po 3-5denní přestávce opakovat.

Složení a účinky jednotlivých ingrediencí:

Složení: Laktóza (240,5 mg), suchý výtažek jetele lučního (100 mg), výtažek isoflavonoidů sóji (37,5 mg), komplex vitaminů (20 mg): (B1 0,9 mg, B2 0,82 mg, B6 9,6 mg, PP 1,14 mg, kyselina listová 0,15 mg), stearát vápenatý (2 mg). Doporučené denní dávkování (2 tob.) zabezpečuje pokrytí denní potřeby isoflavonoidů (75 %) a vitaminů (90-150 %).

Sója si zaslouží zvláštní zájem i pro svůj ozdravný účinek při onemocnění mléčných žláz, intoxikaci těhotných žen atd. Výtažky sóji obsahují vysoký obsah isoflavonoidů, které se s úspěchem používají při alternativní hormonální terapii v období klimakteria. Působení přírodních fytohormonů na organismus je jemné, na rozdíl od syntetických hormonálních preparátů a hlavně je zbaveno vedlejších nežádoucích efektů. Sója, která se používá v MIRRA EVA není geneticky modifikovaná, je 100% přírodní a bezpečná.

Jetel luční obsahuje isoflavonoidy (rostlinné fytoestrogeny), které oslabují nepříjemné projevy v období klimakteria a menopauzy.

Zinek hraje mimořádně důležitou úlohu v činnosti pohlavních žláz. Jeho nedostatek je doprovázen psychickými problémy, snížením sexuální aktivity a předčasným stárnutím.

Vitaminový komplex (vitaminy skupiny B) vykazuje mnohostranný blahodárný účinek, což je zejména důležité v období klimakteria a menopauzy.

Podpurná kúra MIRRA EVA trvá 25-30 dní.

Výrobek není vhodný při individuální nesnášenlivosti složek přípravku, není určen k používání jako náhrada pestré stravy. Nutno dodržovat denní dávkování.

Forma: 50 tob. x 0,4 g = 20g